

Rygning på 3. hånd

Videnskabsfolk advarer nu om passiv rygning på 3. hånd, som alle MCS'ere kender til

Oversættelse af Susanne Hemdorff

De af os, der har MCS, er ikke i tvivl om, at farlige giftstoffer hænger rundt omkring i gardiner, tæpper, tøj, hår og andre steder, længe efter at cigaretterne er slukket. Men mange andre er ikke i samme grad klar over det.

I tidsskriftet Pediatrics er der præsenteret en undersøgelse, hvor læger har undersøgt holdninger til rygning og bevidstheden om risiciene ved passiv rygning på 2. og 3. hånd. Mens de fleste mennesker var klar over risikomomenterne ved passiv rygning på 2. hånd, var der meget ringere kendskab til risikomomenterne ved passiv rygning på 3. hånd. Folk tror for det meste, at når de tænder for en ventilator, så forsvinder røgen – men det gør giftstofferne i virkeligheden ikke. I undersøgelsen fandt man, at en opfattelse af, at passiv rygning på 3. hånd er skadelig, var forbundet med en stor stigning i sandsynligheden for, at rygning ville blive forbudt i hjemmet.

Læs mere på www.nytimes.com - 3. januar 2009

Kilde: Arizona Environmental Health Bulletin, Issue 18, January 15, 2009